Florforical 300mg/mg/mg/

Florfenicol 300mg/ml TRATAMIENTO
DE LAS
ENFERMEDADES SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PORCINO, BOVINO O VINO RESPIRATORIAS
Actinotiacillus spp y Pasteurelia spp AYÚDALOS A RESPIRAR!

s.p.º veterinaria

Florfenicol 300mg/ml



100 ml 250 ml

SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PORCINO, BOVINO Y **OVINO**

COMPOSICIÓN POR ML:

Florfenicol......300mg Excipientes, c.s.

ESPECIES E INDICACIONES:

Bovino: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni,* sensibles al florfenicol. **Porcino:** Tratamiento de brotes agudos de enfermedades respiratorias causadas por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida,* sensibles al florfenicol. **Ovino:** Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio ovino causadas por *Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida* sensibles al florfenicol.

POSOLOGÍA:

<u>Vía de administración:</u> Intramuscular o subcutánea en bovino; intramuscular en porcino y ovino.

Bovino: <u>Vía intramuscular:</u> 20 mg de florfenicol/kg peso vivo (1 ml de medicamento por 15 kg p.v.) dos veces con un intervalo de 48 horas utilizando una aguja de 16 de galga. <u>Vía subcutánea:</u> 40 mg de florfenicol/kg peso vivo (2 ml de medicamento por 15 kg p.v.) en dosis única utilizando una aguja de 16 de galga.

Ovino: 20 mg de florfenicol/kg peso vivo (1 ml de medicamento/15 kg peso vivo) por inyección intramuscular diariamente durante 3 días consecutivos. **Porcino:** <u>Vía intramuscular:</u> 15 mg de florfenicol/kg peso vivo (1 ml de medicamento por 20 kg p.v.) en el músculo del cuello dos veces con un intervalo de 48 horas utilizando una aguja de 16 de galga.

Se recomienda tratar a los animales en estadios tempranos de la enfermedad y evaluar la respuesta al tratamiento en las 48 horas siguientes a la segunda inyección. Si los signos clínicos de enfermedad respiratoria persisten 48 horas después de la última inyección, el tratamiento debe cambiarse utilizando otra formulación u otro antibacteriano continuando hasta que los signos clínicos se hayan resuelto.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente. Limpiar el tapón antes de extraer cada dosis. Utilizar una jeringa y aguja estéril y seca. <u>Bovino:</u> El volumen administrado por punto de inyección no debe exceder de 10 ml en ambas vías de administración (intramuscular y subcutánea). La inyección debe realizarse en el cuello. <u>Ovino:</u> El volumen administrado por punto de inyección no debería exceder 4 ml. <u>Porcino:</u> El volumen administrado por punto de inyección no debe exceder de 3 ml.

TIEMPOS DE ESPERA:

CARNE: Bovino: Por vía intramuscular: 30 días. Por vía subcutánea: 44 días.

Porcino: 18 días. Ovino: 39 días Leche: no usar

Reg Nº: 2659 ESP

