



**s.p. veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60  
Teléfono 977 850 170\* - Fax 977 850 405 - 43330 **RIUDOMS** (Tarragona)

---

### **FICHA TÉCNICA**

1. **NOMBRE:** NOVIREX Registro nº 0959 – P

Uso en el entorno ganadero

2. **COMPOSICIÓN POR ML:**

Glutaraldehído 150 mg

Cloruro de didecil dimetil amonio 100 mg

Excipientes, c.s.

Contiene: D- limoneno

3. **INDICACIONES :**

Desinfectante bactericida, fungicida y virucida de uso ganadero.

Limpieza y desinfección de superficies, suelos, paredes, techos, equipos, pediluvios y rodaluvios en el ámbito zoonosanitario.

Activo frente al virus de la Peste Porcina Africana (PPA) según UNE-EN 14675:2015 al 0.5% durante 30 minutos y la Gripe Aviar según UNE-EN 14675:2015 al 0.5% durante 30 minutos.

4. **DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:**

Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar:

Actividad bactericida y levuricida: usar 1 ml por litro de agua para tratar 10 m2. Dejar actuar durante 30 minutos. Doblar la dosis en casos de grandes infestaciones o superficies porosas.

Actividad virucida: usar 5 ml por litro de agua para tratar 10 m2. Para el control de los virus de la Peste Porcina Africana y la Gripe Aviar, administrar 5 ml por litro de agua y aplicar 3 L de la solución por cada 10 m2. Dejar actuar durante 30 minutos.

Efectuar el tratamiento en ausencia de animales y no introducirlos de nuevo en el área tratada hasta concluir el plazo de seguridad de 6 h y esté convenientemente ventilada.

Eliminar cualquier resto de producto tras el tratamiento de superficies y utensilios que vayan a estar en contacto con alimento o bebida de los animales.

**5. PLAZA DE SEGURIDAD:**

Esperar 6 horas antes del realojo ed los animales

**6. ENVASES:**

5 L.