



Tabla de dosificaciones en avicultura según consumo de agua



Pollos edad días	peso g. / ave	Consumo agua ml. / ave día	Consumo agua Litros / 10 kg. pv. día	ml. Floxavex / Colmyc por litro de agua	ml. Coccivex por litro de agua	g. Lincomicina 40 por litro de agua	g. Aquadox por litro de agua	mg. Hidrotil por litro de agua	mg. Amoxi 50 por litro de agua
				10 mg. / kg.	30 mg. / kg.	6 mg. / kg.	15 mg. / kg.	100 mg. / kg.	15 mg.
7	132	70	5,3	0,19	0,28	0,03	0,06	18,87	0,06
14	377	140	3,7	0,27	0,41	0,04	0,08	27,03	0,08
21	691	190	2,7	0,37	0,56	0,06	0,11	37,04	0,11
28	1061	210	1,97	0,51	0,76	0,08	0,15	50,76	0,15
35	1481	270	1,8	0,56	0,83	0,08	0,17	55,56	0,17
49	2450	330	1,3	0,77	1,15	0,12	0,23	76,92	0,23
PONEDORAS	2000	250	2	0,5	0,75	0,08	0,15	50	0,15

Polvo oral
Lincomicina 40 S.P.
Lincomicina 40%

COCCIVEX
Amprolio (clorhidrato) 200 mg/ml



Hidromutin Solución Oral
HIDROTIL Polvo oral
Tilosina (tartrato) 100%



Colmyc-C
Colistina 10% Polvo Hidrosoluble
COLIMICINA

S. P. Veterinaria S. A. Ctra. Reus-Vinyols, km. 4,1 apartado 60 43330 - RIUDOMS (Tarragona) Tel.977 850 170 - Fax 977850 405